

STOP 糖尿病

2023年10月16日発行 糖尿病ケアチーム通信 第6号

マンジャロ皮下注 2.5mg/5mg/7.5mg/10mg/12.5mg/15mg アテオス



マンジャロ皮下注（成分名：チルゼパチド）は、2023年4月に発売された持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬です。2型糖尿病患者のみ適応の週1回使用の注射剤（1回使い切り製剤）で、全6規格あります。

～GIP・GLP-1 とは??～

GIP と GLP-1 はもともと私たちの体にあるホルモンです。このホルモンは、食事摂取に伴い小腸から分泌され、膵臓に作用しインスリン分泌を促進します。血糖値が正常あるいは低い場合はインスリンを増強しません。



マンジャロ皮下注アテオスはこのホルモンと同様に働くように作られた薬剤です。

使用法は3つのステップで操作が簡単、針の取り付け作業不要！！



○適応：2型糖尿病

○用法及び用量

週1回 2.5mg から開始、4週間投与した後、週1回 5mg に増量。維持用量は週1回 5mg。患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回 5mg で効果不十分な場合は4週間以上の間隔で 2.5mg ずつ増量可能。最大用量は週1回 15mg

○副作用

- ・下痢、便秘、嘔気、嘔吐、食欲不振などの胃腸障害
- ・低血糖（SU薬、グリニド薬又はインスリンと併用する場合）
- ・急性膵炎、胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ滞性黄疸

○注意事項

- ・週1回、同一曜日に投与
- ・用量依存的な体重減少が認められるため過度の体重減少は注意
(BMIが23kg/m²未満の患者では有効性及び安全性は検討されていない)
- ・開始用量の 2.5mg で血糖コントロール良好であっても、5mgへ増量する必要がある
(5mgへ増量し、2.5mgへ減量することは問題ないが、開始用量の 2.5mg のみ継続使用は不可)
- ・新薬のため投与制限あり、2024年3月末まで2週間処方 ※全6規格
- ・冷蔵庫保管 ※冷蔵庫の使用が出来ない場合は室温（30℃以下）で21日間まで保管可能
- ・投与を忘れた場合、次の投与予定日まで3日（72時間）以上ある場合はすぐ投与、その後はあらかじめ定められた曜日に投与する。次の投与予定日まで3日（72時間）未満の場合は忘れた分をとばして、その後は次のあらかじめ定めた曜日に投与する



文責：薬局 新井山